

Tableaux comparatifs des antihypertenseurs

TABLEAU COMPARATIF DES ANTAGONISTES DES RECEPTEURS DE L'ANGIOTENSINE II (ARA)

		Azilsartan	Candésartan	Éprosartan	Irbésartan
Indications	Marque de commerce	Édarbi® ★	Atacand® ★	Teveten® ★	Avapro® ★
	Hypertension				
	Indication	OUI	OUI	OUI	OUI
	Posologie Initiale habituelle	40 mg die	16 mg die	600 mg die	150 mg die
	Gamme posologique	40-80 mg par jour en 1 prise	4-32 mg par jour en 1 prise	400-800 mg par jour en 1 prise	75-300 mg par jour en 1 prise
Posologie	Posologie maximale	80 mg	32 mg	800 mg	300 mg
	Insuffisance cardiaque *				
	Indication	NON	OUI	NON	NON
	Posologie Initiale habituelle	-	4 mg	-	-
	Gamme posologique	-	4-32 mg	-	-
Propriétés	Posologie maximale	-	32 mg	-	-
	Lithium	Surveiller concentration sérique de lithium	Surveiller concentration sérique de lithium	Surveiller concentration sérique de lithium	Surveiller concentration sérique de lithium

Chez la personne âgée ou lorsqu'il y a association avec un diurétique, ou en présence d'insuffisance rénale modérée à sévère ou en présence de maladie hépatique significative, il est prudent d'initier un ARA avec des doses réduites, tel qu'illustré dans ce tableau dans la section « Posologies initiales habituelles ».

Une mesure de la créatinémie et de la kaliémie est recommandée environ deux semaines après le début de la prise des ARA.

Il est généralement recommandé d'attendre de 2 à 4 semaines avant d'augmenter la médication lors du suivi de patients souffrant d'hypertension artérielle légère à modérée (Grade 1 et 2).

** Les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II peuvent être prescrits pour traiter l'insuffisance cardiaque lorsque les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ne sont pas tolérés en raison de la toux (Étude ELITE et ELITE II avec losartan, étude Val-HeFT avec valsartan et étude CHARM avec candésartan).*

Ce tableau a été établi à partir des monographies officielles.

★ : certains médicaments antihypertenseurs ne sont plus commercialisés sous leur nom d'origine; de multiples formulations génériques peuvent être disponibles

Tableaux comparatifs des antihypertenseurs

TABLEAU COMPARATIF DES ANTAGONISTES DES RECEPTEURS DE L'ANGIOTENSINE II (ARA)

		Losartan	Olmésartan	Telmisartan	Valsartan
Propriétés	Indications	Hypertension			
	Indication	OUI	OUI	OUI	OUI
	Posologie Initiale habituelle	50 mg die	20 mg die	80 mg die	80 mg die
	Gamme posologique	25-100 mg par jour en 1 prise	20-40 mg die	40-80 mg par jour en 1 prise	80-160 mg par jour en 1 prise
	Posologie maximale	100 mg	40 mg	80 mg	160 mg
Propriétés	Indications	Insuffisance cardiaque *			
	Indication	NON	NON	NON	OUI
	Posologie Initiale habituelle	-	-	-	40 mg bid
	Gamme posologique	-	-	-	40 mg bid à 160 mg bid
	Posologie maximale	-	-	-	160 mg bid
	Lithium	Surveiller concentration sérique de lithium	Surveiller concentration sérique de lithium	Surveiller concentration sérique de lithium	Surveiller concentration sérique de lithium

Chez la personne âgée ou lorsqu'il y a association avec un diurétique, ou en présence d'insuffisance rénale modérée à sévère ou en présence de maladie hépatique significative, il est prudent d'initier un ARA avec des doses réduites, tel qu'illustré dans ce tableau dans la section « Posologies initiales habituelles ».

Une mesure de la créatinémie et de la kaliémie est recommandée environ deux semaines après le début de la prise des ARA.

Il est généralement recommandé d'attendre de 2 à 4 semaines avant d'augmenter la médication lors du suivi de patients souffrant d'hypertension artérielle légère à modérée (Grade 1 et 2).

** Les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II peuvent être prescrits pour traiter l'insuffisance cardiaque lorsque les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ne sont pas tolérés en raison de la toux (Étude ELITE et ELITE II avec losartan, étude Val-HeFT avec valsartan et étude CHARM avec candésartan).*

Ce tableau a été établi à partir des monographies officielles

★ : certains médicaments antihypertenseurs ne sont plus commercialisés sous leur nom d'origine; de multiples formulations génériques peuvent être disponibles