Lexique

DFGe = débit de filtration glomérulaire estimé – HCTZ = hydrochlorothiazide

HTA = hypertension artérielle – MCV = maladie cardiovasculaire – PA = pression artérielle – PAS = pression artérielle systolique

*Les affections et états associés à un risque élevé de MCV sont : la MCV établie (cardiopathie ischémique, insuffisance cardiaque, maladie vasculaire cérébrale, maladie artérielle périphérique), le diabète mellitus de type 1 ou 2, la maladie rénale chronique (DFGe < 60 mL/min/1,73 m² ou albuminurie ≥ 3 mg/mmol), un score de Framingham pour la prédiction du risque sur 10 ans ≥ 20 %⁶² et un âge ≥ 75 ans.

†Une association en monocomprimé est préférable si elle est offerte et couverte. Sinon, 2 comprimés distincts peuvent être utilisés, en privilégiant un diurétique de type thiazidique à longue durée d'action plutôt qu'un diurétique thiazidique.

En cas de risque élevé d'hypotension symptomatique, un traitement initial avec un seul agent est raisonnable.

Il faut éviter ou cesser les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II chez toute personne enceinte ou souhaitant le devenir.

‡Voir le tableau 3 pour les associations en monocomprimé actuellement offertes au Canada.

§Comprend : aggravation soudaine et inexplicable de l'HTA, hypokaliémie, nodule surrénalien, souffle abdominal, lésion rénale aiguë après le traitement de l'HTA, HTA grave ou maligne, HTA chez une personne jeune et HTA résistante.